



BADANIE SEROLOGICZNE WYKRYWAJĄCE PRZECIWCIAŁA PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI: anty-SARS-CoV-2 IgM IgG

Metoda badania	półilościowe oznaczenie zautomatyzowane na nowoczesnym analizatorze immunologicznym firmy Roche Diagnostics, test przesiewowy
Metoda pobrania materiału	Próbka krwi żyłnej, nie jest wymagane bycie na czczo
Czas oczekiwania	Wynik zazwyczaj do 8 godz. od pobrania materiału, maksymalnie do 2 dni
Cel badania	• Dodatni wynik badania (wartość COI ≥ 1 co daje wynik „reaktywny”) MOŻE ŚWIADCZYĆ O PRZEBYCIU ZAKAŻENIA W PRZESZŁOŚCI (klasa przeciwciał IgG) LUB TOCZĄCEJ SIĘ INFЕКCJI (klasa przeciwciał IgM) • Ujemny wynik (wartość COI < 1 co daje wynik „niereaktywny”) świadczy, że organizm nie wytworzył przeciwciał. • Ujemny wynik („niereaktywny”) nie wyklucza infekcji SARS-CoV-2 • Aby ostatecznie wykluczyć lub potwierdzić zakażenie SARS-CoV-2 należy wykonać badanie z zastosowaniem diagnostyki molekularnej techniką RT-PCR



49 PLN

**LABORATORIUM
ANALIZ LEKARSKICH S.C.**

34-400 Nowy Targ, ul. Orkana 19

www.labnowytag.pl



Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Przed wykonaniem badania zapoznaj się z klauzulą informacyjną w Rejestracji Laboratorium lub na www.labnowytag.pl